

Le 6 février 2020

Panzyga® (immunoglobuline intraveineuse, IgIV) d'Octapharma : Une IgIV établie offerte par l'entremise de la Société canadienne du sang (SCS)

Cher Professionnel de la santé,

Nous sommes heureux d'annoncer l'offre continue de Panzyga® (IgIV, Octapharma) pour vos patients par l'entremise du formulaire de commande de la SCS. Panzyga® est une préparation liquide stérile d'immunoglobuline G (IgG) très purifiée pour administration intraveineuse. Il est approuvé au Canada dans le traitement des patients atteints d'un déficit immunitaire primaire (DIP), d'un déficit immunitaire secondaire (DIS), de purpura thrombopénique auto-immun (PTAI) ou du syndrome de Guillain-Barré (SGB) modéré ou grave. L'innocuité et l'efficacité de Panzyga® ont été établies dans le cadre d'études cliniques bien contrôlées. Depuis son lancement, plus de 3 millions de grammes de Panzyga® ont été perfusés à des patients au Canada.

Indication ¹	Dose recommandée ¹
Traitement du DIP et du DIS	200 à 800 mg/kg toutes les 3 à 4 semaines
Traitement du PTAI	2 g/kg, en deux doses de 1 g/kg (10 mL/kg) administrées lors de 2 jours consécutifs
Traitement du SGB modéré ou grave	2 g/kg (20 mL/kg) en doses réparties sur une période allant de 2 à 5 jours consécutifs

Panzyga® est préparé à partir de grands lots de plasma humain provenant des États-Unis ou du Canada. L'inactivation ou l'élimination des agents pathogènes est obtenue par un traitement par solvant-détergent (S/D), une nanofiltration (arrêt des particules de 20 nm) et une chromatographie par échange d'ions¹. Il s'agit d'une solution à 100 mg/mL pour perfusion intraveineuse, offerte en trois formats de fiole pratiques : 5 g, 20 g et 30 g. Il se conserve à une température se situant entre 2 et 8 °C pendant 36 mois à compter de la date de fabrication. Pendant cette période, le produit peut être conservé à une température de ≤ 25 °C pendant un maximum de 12 mois¹.

Renseignements importants liés à l'innocuité : Comme pour toutes les immunoglobulines, Panzyga® est contre-indiqué chez les patients ayant déjà eu une réaction anaphylactique ou générale grave à une préparation d'immunoglobulines humaines. Panzyga® est contre-indiqué chez les personnes présentant un déficit sélectif en IgA associé à la formation d'anticorps dirigés contre les IgA. Pour obtenir les renseignements posologiques complets, veuillez consulter la monographie de produit de Panzyga® [ici](#). Pour de plus amples renseignements médicaux, communiquez par courriel au medinfo@octapharma.com ou par téléphone au 1 888 438-0488.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Sri Adapa
Directeur général

Réf. : Monographie de produit canadienne de Panzyga®, 22 août 2019

Octapharma Canada inc.
308-214 King Street West
Toronto (Ontario) M5H 3S6

Téléphone : 1 416 531-5533
Courriel : info@octapharma.ca